



TAKHZYRO (lanadelumab) BRUGERINSTRUKTION

En trinvis vejledning i brugen af din forfyldte TAKHZYRO sprøjte

Du har fået denne brochure, fordi du, eller en som du hjælper, har fået ordineret TAKHZYRO.

TAKHZYRO er et lægemiddel, der kan anvendes til patienter i alderen 2 år og derover, til forebyggelse af angioødemanfald hos patienter med arvet angioødem (HAE).

Brochuren uddeles af sundhedspersonale. Læs omhyggeligt indlægssedlen.

TAKHZYRO[®]
lanadelumab subkutan injektion

TAKHZYRO INSTRUKTIONSFILM


På medicininstruktion.dk findes en film, der viser, hvordan du anvender TAKHZYRO.



DIN FORFYLDTE TAKHZYRO SPRØJTE ER KLAR TIL BRUG

Den forfyldte TAKHZYRO sprøjte er et brugsklart lægemiddel til injektion under huden. Injektionen kan enten gives af dig selv eller af din omsorgsperson. Læge eller sygeplejerske skal vise dig, hvordan du klargør og injicerer TAKHZYRO på den rigtige måde, før du bruger det første gang.


Dele af den forfyldte TAKHZYRO sprøjte:



Du skal også bruge:



Spritserviet



Vatkugle/gazebind



Plaster




Kanyleboks

Vigtigt

Opbevar altid kanyleboksen utilgængeligt for børn.


GØR KLAR TIL INJEKTIONEN

1. Tag en spritserviet, vatkugle/gazebind, plaster og kanyleboks, og placér dem på en ren overflade i et godt oplyst område. Disse hjælpemidler er ikke inkluderet i TAKHZYRO-pakningen.
2. Fjern den forfyldte TAKHZYRO sprøjte fra køleskabet, åbn kartonæsken og tag den forfyldte TAKHZYRO sprøjte ud af bakken.
 - **Brug ikke** den forfyldte TAKHZYRO sprøjte, hvis forseglingen er åben eller ødelagt.
 - **Lad den forfyldte TAKHZYRO sprøjte nå stuetemperatur i mindst 15 til 30 minutter, før du forbereder din injektion.**
 - Din medicin er følsom over for varme temperaturer. **Brug ikke** eksterne varmekilder såsom varmt vand til at opvarme den forfyldte TAKHZYRO sprøjte.
 - **Fjern ikke** kanylehætten, før du er klar til at injicere.
3. Vask hænderne med sæbe og vand, og tør hænderne.



4. Kontrollér udløbsdatoen på etiketten.

- **Brug ikke** den forfyldte TAKHZYRO sprøjte, hvis udløbsdatoen er overskredet.



5. Kontrollér den forfyldte TAKHZYRO sprøjte for eventuelle skader, og vær sikker på, at medicinen er farveløs til svagt gul.

- **Brug ikke** produktet, hvis sprøjten er beskadiget – f.eks. revnet sprøjte.
- **Administrer ikke**, hvis medicinen er misfarvet, uklar eller der er flager eller partikler i den.
- Du ser muligvis luftbobler i den forfyldte TAKHZYRO sprøjte. Det er normalt og påvirker ikke din dosis.


Opbevaring af den forfyldte TAKHZYRO sprøjte

- Opbevar den forfyldte TAKHZYRO sprøjte i køleskabet ved 2 °C til 8 °C. **Må ikke** nedfryses.
- Hvis den forfyldte TAKHZYRO sprøjte fjernes fra køl, så skal den opbevares under 25 °C og bruges inden for 14 dage. Sæt ikke den forfyldte TAKHZYRO sprøjte tilbage i køleskabet efter opbevaring ved stuetemperatur.
- Opbevar den forfyldte TAKHZYRO sprøjte i den originale karton for at beskytte den forfyldte sprøjte mod lys.
- **Omryst ikke** den forfyldte TAKHZYRO sprøjte.
- Opbevar den forfyldte TAKHZYRO sprøjte og al medicin utilgængeligt for børn.

VÆLG OG RENGØR INJEKTIONSSTEDET

1. Den forfyldte TAKHZYRO sprøjte skal injiceres i din mave, lår eller bagsiden af overarmen (det ydre område af overarmen anbefales ikke, hvis du injicerer dig selv).

- Det er vigtigt at skifte injektionssteder for at holde huden sund. En ny injektion skal gives mindst 3 cm fra det sidste sted, du brugte.
- **Injicér ikke** på et område af din krop, hvor huden er irriteret, rødmosset, forslået eller inficeret.
- Det område, du vælger til injektion, skal være mindst 5 cm væk fra eventuelle ar eller din navle.




2. Rengør injektionsstedet med en spritserviet, og lad det tørre.

- **Vift eller pust ikke** på det rene sted.
- **Rør ikke** ved dette område igen, før du giver din injektion.


3. Fjern kanylehætten fra den forfyldte TAKHZYRO sprøjte. Træk forsigtigt kanylehætten lige af med den ene hånd, og hold den midterste del af den forfyldte TAKHZYRO sprøjte fast med den anden hånd. Smid kanylehætten væk.

- **Sæt ikke** hætten på den forfyldte TAKHZYRO sprøjte igen.
- **Brug ikke** den forfyldte TAKHZYRO sprøjte, hvis den har været tabt uden kanylehætten på, eller hvis kanylen ser beskadiget eller bøjet ud.
- **Rør ikke** ved kanylen, og lad ikke kanylen røre noget.



INJICÉR TAKHZYRO

1. Tag den forfyldte TAKHZYRO sprøjte i den ene hånd som en blyant. Undgå at røre ved kanylen eller trykke på stemplet.
2. Klem forsigtigt en hudfold på ca. 3 cm med din anden hånd på det rensede injektionssted.
3. Med en hurtig, kort bevægelse skubbes kanylen helt ind i huden. Sørg for at holde kanylen på plads.
4. **Tryk langsomt** på stemplet, indtil al væsken injiceres, og sprøjten er tom, og slip derefter forsigtigt din hud.
5. Træk langsomt kanylen tilbage mens du holder sprøjten i samme vinkel.
6. Tryk om nødvendigt, vatkugle eller gazebind ind over injektionsstedet, og hold på det i 10 sekunder.
 - **Gnid ikke** på injektionsstedet. Du kan opleve en mindre blødning. Det er normalt.
 - Dæk injektionsstedet med et plaster om nødvendigt.
7. Smid den brugte TAKHZYRO sprøjte væk.
 - **Rør ikke** ved kanylen.
 - **Sæt ikke** hættten på kanylen igen. Det er for at undgå en nålestikskade.
 - Læg din brugte TAKHZYRO sprøjte i en kanyleboks øjeblikkeligt efter brug.
 - **Genbrug ikke** den brugte TAKHZYRO sprøjte.



Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du har en alvorlig allergisk reaktion over for TAKHZYRO med symptomer som udslæt, trykken for brystet, hivende vejrtrækning eller hurtige hjerteslag, skal du straks kontakte lægen eller sygeplejersken.

Hvis du oplever nogle af nedenstående bivirkninger, skal du kontakte lægen eller sygeplejersken:

- Reaktioner på injektionsstedet – symptomerne omfatter smerter, rødmen på huden, blå mærker, ubehag, hævelse, blødning, kløe, fortykkelse af huden, snurren, varme og udslæt.
- Allergiske reaktioner, herunder kløe, ubehag og snurren i tungen
- Svimmelhed, mathed
- Hævet hududslæt
- Muskelsmerter
- Blodtests viser ændringer i leveren

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i indlægssedlen eller efter lægens eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sygeplejersken.



Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbæk Strand
www.takeda.dk

C-ANPROM/DK/TAKH/0098 22.04.2024

TAKHZYRO[®]
lanadelumab subkutan injektion